

Claritine®

10 mg comprimate
Loratadină



Citiți cu atenție și în întregime acest prospect deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament este disponibil fără prescripție medicală. Cu toate acestea, este necesar să utilizați Claritine 10 mg comprimate cu atenție pentru a obține cele mai bune rezultate.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc după 10 zile.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Claritine 10 mg comprimate și pentru ce se utilizează
2. Înainte să utilizați Claritine 10 mg comprimate
3. Cum să utilizați Claritine 10 mg comprimate
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Claritine 10 mg comprimate
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE CLARITINE 10 MG COMPRIMATE ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Claritine aparține unei clase de medicamente cunoscute ca antihistaminice. Antihistaminicele ajută la reducerea simptomelor alergiei împiedicând efectele unei substanțe numite histamină, care este produsă în corp.

Claritine ameliorează simptomele asociate rinitei alergice (de exemplu, febra fânului), cum ar fi strănutul, hipersecreția sau mâncărimea la nivelul nasului, usturimea sau mâncărimea la nivelul ochilor.

Claritine poate fi, de asemenea, utilizat pentru reducerea simptomelor de urticarie (mâncărime, roșeață, precum și numărul și dimensiunile erupțiilor de pe piele).

Ameliorarea acestor simptome se menține întreaga zi și vă ajută să vă reluați activitățile zilnice obișnuite și să dormiți.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI CLARITINE 10 MG COMPRIMATE

Nu utilizați Claritine

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la loratadină sau la oricare dintre celelalte componente ale Claritine 10 mg comprimate.

Aveți grijă deosebită când utilizați Claritine

Înainte de a utiliza Claritine informați medicul dumneavoastră sau farmacistul:

- dacă suferiți de o afecțiune hepatică.

Utilizarea altor medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Teste de laborator

Dacă sunteți programat să efectuați orice test cutanat (de piele) pentru alergii nu trebuie să utilizați Claritine timp de două zile înainte de efectuarea acestor teste deoarece acest medicament ar putea influența rezultatele testului.

Utilizarea Claritine împreună cu alimente și băuturi

Claritine poate fi administrat cu sau fără alimente.

La utilizarea Claritine nu s-a demonstrat creșterea efectelor băuturilor alcoolice.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă nu este recomandată administrarea Claritine.

Dacă alăptați nu este recomandată administrarea Claritine. Loratadina este excretată în laptele matern.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

La doza recomandată de Claritine nu se anticipează ca acesta să determine somnolență sau scăderea vitezei de reacție. Cu toate acestea, foarte rar, la unele persoane poate apărea somnolența, fapt ce le-ar putea afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informații importante privind unele componente ale Claritine

Claritine conține lactoză; de aceea, dacă medicul dumneavoastră v-a informat că suferiți de intoleranță la anumite zaharuri, luați legătura cu acesta înainte de administrarea medicamentului.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI CLARITINE 10 MG COMPRIMATE

Utilizați întotdeauna Claritine așa cum v-a prescris medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani:

Luați un comprimat o dată pe zi cu un pahar cu apă, cu sau fără alimente.

La copiii cu vârsta între 2 și 12 ani dozarea se face în funcție de greutatea corporală:

Greutate corporală mai mare de 30 kg:

Luați un comprimat o dată pe zi cu un pahar cu apă, cu sau fără alimente.

Pacienți cu insuficiență hepatică severă

Adulți și copii cu greutate corporală mai mare de 30 kg:

Luați un comprimat o dată la fiecare două zile cu un pahar cu apă, cu sau fără alimente.

Claritine 10 mg comprimate nu este recomandat la copiii cu vârsta mai mică de 2 ani.

Dacă utilizați mai mult Claritine 10 mg comprimate decât trebuie

Utilizați Claritine doar așa cum v-a fost prescris. La supradozarea accidentală nu sunt de așteptat să apară probleme grave. Cu toate acestea, dacă ați luat mai mult Claritine decât v-a fost recomandat, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În caz de supradozare cu Claritine au fost raportate somnolență, bătăi rapide ale inimii și durere de cap.

Dacă uitați să utilizați Claritine 10 mg comprimate

Dacă ați uitat să luați doza la timp, luați-o cât mai curând posibil și apoi reveniți la schema de administrare obișnuită. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Claritine 10 mg comprimate

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, Claritine poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cele mai frecvente reacții adverse raportate la copii cu vârste între 2 și 12 ani includ durerile de cap, nervozitatea și oboseala. Cele mai frecvente reacții adverse raportate la adulți și adolescenți includ somnolență, dureri de cap, creșterea poftei de mâncare și tulburări ale somnului.

Pe perioada după punerea pe piață a Claritine au fost raportate foarte rar cazuri de reacție alergică severă, amețeli, bătăi ale inimii neregulate sau rapide, greață (stare de rău), uscăciune a gurii, indigestie, probleme ale ficatului, căderea părului, erupții trecătoare pe piele și oboseală. Nu este posibilă determinarea frecvenței cu care aceste reacții pot să apară.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nementionată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CLARITINE 10 MG COMPRIMATE

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C în ambalajul original.

Nu utilizați Claritine 10 mg comprimate după data de expirare înscrisă pe ambalaj și folie, după „EXP”.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu utilizați Claritine 10 mg comprimate dacă observați orice modificare de aspect al comprimatelor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ce conține Claritine 10 mg comprimate

- Substanța activă este loratadină 10 mg.
- Celelalte componente ale comprimatului sunt lactoză monohidrat, amidon de porumb și stearat de magneziu.

Cum arată Claritine 10 mg comprimate și conținutul ambalajului

Claritine 10 mg comprimate: comprimate albe sau aproape albe, înscrispionate cu „10” pe una dintre fețe și netede pe cealaltă, ambalate în cutii a câte o folie cu 10 comprimate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și Fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață:

BAYER S.R.L.

Șos. Pipera Nr. 42, Etajele 1,16,17,
Sector 2, București , Romania

Fabricantul:

SCHERING – PLOUGH LABO N.V., Belgia

Acest prospect a fost aprobat în iunie 2015